

LUCÉLIA CRISTINA ALVES

**QUANTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES E CARACTERIZAÇÃO DO USO DE  
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO  
PARANAÍBA-MG**

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa –  
*Campus* Rio Paranaíba, como parte das exigências do  
Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Produção  
Vegetal, para obtenção do título de *Magister Scientiae*.

RIO PARANAÍBA  
MINAS GERAIS - BRASIL  
2017

**Ficha catalográfica preparada pela Seção de Catalogação e  
Classificação da Biblioteca UFV - Campus de Rio Paranaíba**

T

A474q  
2017

Alves, Lucélia Cristina, 1986-

Quantificação de biomarcadores e caracterização do uso de defensivos agrícolas por agricultores familiares do Alto Paranaíba-MG. / Lucélia Cristina Alves – Rio Paranaíba, MG, 2017. viii, 42f : il. ; 29cm.

Inclui apêndices.

Orientador: Fabrícia Queiroz Mendes.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Viçosa.

Inclui bibliografia.

1. Defensivos Agrícolas. 2. Agricultores. 3. Equipamento de Proteção Individual. I. Universidade Federal de Viçosa. Departamento de Ciências Agrárias. Mestrado em Agronomia-Produção Vegetal (campus CRP). II. Título.

632.95

LUCÉLIA CRISTINA ALVES

**QUANTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES E CARACTERIZAÇÃO DO USO DE  
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO  
PARANAÍBA-MG**

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa –  
*Campus* Rio Paranaíba, como parte das exigências do  
Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Produção  
Vegetal, para obtenção do título de *Magister Scientiae*.

APROVADA: 03 de março de 2017.

---

Milene Therezinha das Dores

---

Monise Viana Abranches  
(Coorientadora)

---

Fabírcia Queiroz Mendes  
(Orientadora)

## AGRADECIMENTOS

A Deus que me deu forças para trilhar mais uma jornada em minha vida e que me concedeu como aliados as pessoas que menciono abaixo e tantas outras que permanecerão em lembrança.

Aos meus pais, meus amores, obrigada pelo apoio constante que mesmo desconhecendo o que realmente é o mestrado me apoiaram e sabiam que adicionaria a minha vida. Eu amo vocês!

Aos meus irmãos e sobrinhos (as) pelo apoio e compreensão pelo tempo diminuído de estar com vocês.

Ao meu noivo, por participar integralmente de mais uma etapa em minha vida, com o incentivo e apoio constante.

A minha orientadora Fabrícia que fez honrar o adjetivo “mãe” que muitas vezes lhes são designados. Foi muito mais que uma orientadora, foi amiga, conselheira e acima de tudo torcedora para que o melhor se realizasse em minha vida. Muito obrigada de coração pela orientação, amizade, estímulo e ensinamentos imprescindíveis à realização deste trabalho e a minha formação como pesquisadora e pessoa.

A minha co-orientadora Monise, o desafio foi lançado, foi difícil (risos), mas que resultados excelentes alcançamos e não poderia deixar de “[...] obrigada pelo carinho dispensado ao meu projeto. ” E ao meu co-orientador Marcelo pela contribuição dada a este trabalho, pelos ensinamentos e exemplos.

As estagiárias pela enorme ajuda e disponibilidade.

Aos produtores, meu agradecimento especial pela receptividade em seus lares sem ao menos saber quem eu era e o que buscava! Obrigada pela paciência e pelo tempo disponibilizado e principalmente pela confiança, pois a ajuda de vocês não foi apenas externa, mas sim muito mais invasiva! Como aprendi com vocês!

Ao Admilson da EMATER agradeço pela receptividade, ajuda e disponibilidade.

A professora Milene obrigada por estar participando de mais um momento importante e especial em minha vida.

A Universidade Federal de Viçosa *campus* Rio Paranaíba agradeço pela minha formação, minha experiência acadêmica e agora pelo Mestrado.

Enfim, a todos que não foram mencionados aqui, mas participaram e contribuíram para a conclusão desse trabalho.

## SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS.....	iv
RESUMO .....	v
ABSTRACT .....	vii
1 INTRODUÇÃO.....	1
2 MATERIAL E MÉTODOS.....	5
2.1 Seleção da amostra .....	5
2.2 Entrevista.....	6
2.3 Coleta das amostras de sangue .....	6
2.3.1 Determinação da atividade enzimática.....	7
2.3.2. Glutamato Oxaloacetato Transaminase (TGO).....	7
2.3.3 Glutamato Piruvato Transaminase (TGP) .....	7
2.3.4 Fosfatase Alcalina (FA).....	7
2.3.5 Acetilcolinesterase (AChE).....	7
2.4 Tratamentos de dados .....	7
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO .....	8
4 CONCLUSÃO.....	28
5 REFERÊNCIAS .....	29
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	38
APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista.....	41

## LISTA DE ABREVIATURAS

AChE: Acetilcolinesterase

AGEITEC: Agência Embrapa de Informação Tecnológica

ANDEF: Associação Nacional de Defesa Vegetal

BPA: Boas Práticas Agrícolas

EPI: Equipamento de Proteção Individual

FA: Fosfatase Alcalina

FAO: Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INCA: Instituto Nacional do Câncer

INPEV: Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias

MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego

TGO: Transaminase Oxalacética

TGP: Transaminase Glutâmico Pirúvica

## RESUMO

ALVES, Lucélia Cristina, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, fevereiro de 2017. **Quantificação de biomarcadores e caracterização do uso de defensivos agrícolas por agricultores familiares do Alto Paranaíba-MG.** Orientadora: Fabrícia Queiroz Mendes. Coorientadores: Monise Viana Abranches e Marcelo Rodrigues dos Reis.

Os defensivos agrícolas são largamente utilizados para proteger as culturas do ataque de pragas, doenças e plantas invasoras, minimizando as perdas de rendimento. Ao mesmo tempo, há evidências diretas e indiretas de perigos envolvidos no uso destes insumos químicos para os seres humanos e o meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi identificar, descrever e analisar o uso defensivos agrícolas, com ênfase na agricultura familiar, por produtores do Alto Paranaíba, MG, como um fator de risco para a saúde, e avaliar essa exposição por meio da quantificação dos biomarcadores enzimáticos AChE, FA, TGO e TGP. As informações foram coletadas através de entrevista semiestruturada, as quais foram gravadas com auxílio de gravador de voz e transcritas. Foram mensuradas a atividade das enzimas AChE, TGO, TGP e FA divididas em dois grupos: exposto, composto por agricultores familiares que trabalhavam ativamente nas atividades agrícolas; e controle composto por pessoas que não tinham exposição direta prévia a defensivos agrícolas. Os dados referentes às condições socioeconômicas foram analisados por meio da estatística descritiva. O conteúdo das entrevistas foi analisado por meio da técnica de Bardin (2006). As concentrações dos biomarcadores foram analisados pelo teste F a 5% de probabilidade. Do total de participantes, 86,7% eram agricultores cujas atividades agrícolas eram realizadas predominantemente pela mão-de-obra familiar que executavam todas as etapas da produção, dentre elas a pulverização com defensivos. A estratégia para o controle de pragas adotado informado por 100% dos entrevistados foi exclusivamente a aplicação de defensivos agrícolas, pois estes agricultores tem a concepção de que são indispensáveis para o controle de pragas. Os defensivos possuem diferentes denominações segundo os entrevistados, os quais incluem: remédio, veneno, produto e agrotóxico. Todos os agricultores relataram não ter local próprio, como preconiza a legislação, para a guarda tanto dos defensivos, quanto das embalagens vazias, mas garantiam que eram armazenados em locais isolados do contato de crianças e animais e separado de outros equipamentos. A logística reversa das embalagens vazias era deficiente, sendo ressaltadas as dificuldades de entrega das mesmas. A maioria dos produtores (66,7%) só aplicam defensivos mediante a receita agrônômica, enquanto 33,3%

aplicam considerando o próprio conhecimento. O uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) foi confirmado pelos participantes, porém era comum ser limitado a apenas algumas peças. Os itens menos usados foram os óculos (33,3%) e as luvas (53,3%) e os mais usados foram a roupa (73,3%) e a máscara (66,7%). Segundo os relatos, os agricultores consideram os defensivos perigosos para a saúde. O sintoma de intoxicação aguda mais comum entre os agricultores foi a cefaleia, porém não tinham a conduta de procurarem os serviços de atendimento médico mediante mal-estar durante ou após as pulverizações. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos exposto e controle em qualquer parâmetro bioquímico. Os resultados da AChE encontrados com níveis próximos ao mínimo dos valores de referência, pertenciam aos produtores que não usavam os EPI. Os agricultores foram expostos aos defensivos com proteção insuficiente e inadequada, necessitando portanto, de treinamentos e orientações para melhor proteção.

## ABSTRACT

ALVES, Lucélia Cristina, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, February, 2017. **Quantification of biomarkers and characterization of the use of pesticides by farmers the Alto Paranaíba-MG.** Advisor: Fabrícia Queiroz Mendes. Co-advisors: Monise Viana Abranches and Marcelo Rodrigues dos Reis.

The pesticides are widely used to protect crops from pests, diseases and invasive plants, minimizing the loss of income. At the same time there are direct and indirect evidence of the dangers involved in the use of chemical inputs to human beings and the environment. The aim of this study was to identify, describe and analyze the use of pesticides, with emphasis on family agriculture, by producers of the High Paranaíba, MG, as a risk factor for health and to assessing this exposure through the quantification of biomarkers enzyme AChE, FA, TGO e TGP. This information was collected through semi-structured interview, which was recorded with the aid of voice recorder and transcribed. Enzyme activities were measured AChE, TGO, TGP and FA divided into two groups: exposed, composed of family farmers who worked actively in agricultural activities and control composed of people who did not have previous direct exposure to agricultural pesticides. The data relating to socioeconomic conditions were analyzed through descriptive statistic. The content of the interviews was analyzed by means of the technique of Bardin (2006). The concentration of biomarkers was examined by F to 5% probability. Of the total participants, 86.7% were farmers whose agricultural activities were carried out mainly by family labour that performed all stages of production, including spraying with pesticides. The pest control strategy adopted by 100% of respondents was exclusively the application of agrochemicals, as these farmers have the conception that they are indispensable for pest control. The pesticides have different names according to the respondents, which include: medicine, poison, product and pesticide. All farmers have reported not having its own local advocates, legislation for both guard, how much of the empty containers, but ensured that the pesticides were stored in isolated places of contact of children and animals and separated from other equipment. The reverse logistics of empty containers was handicapped, and highlighted the difficulties of delivery. The majority of producers (66.7%) only apply pesticides by agricultural revenue, while 33.3% apply whereas the own knowledge. The use of Individual Protection Equipment (EPI) was confirmed the participants, but it was common to be limited to only a few pieces. The less used items were the glasses (33.3%) and gloves (53.3%) and the most used were the clothes (73.3%) and mask (66.7%). According to reports, farmers consider

pesticides dangerous to health. The most common symptom of acute poisoning among farmers was the headache, however didn't have the conduct of seeking medical care services through malaise during or after the spraying. There were no significant differences between exposed and control groups in any biochemical parameter. Find results found with levels near the minimum of the values of reference, belonged to producers who didn't wear EPI. Farmers were exposed to pesticides with insufficient and inadequate protection, requiring porting, training and guidelines for better protection.

## 1 INTRODUÇÃO

A população mundial cresce a cada ano e acarreta com isso a necessidade de um aumento na produção de alimentos em espaços cada vez mais limitados. Para atender à crescente demanda, houve nas últimas décadas, um aumento na produção agrícola e conseqüentemente um aumento no uso dos defensivos (BARREIRA; PHILIPPI JUNIOR, 2002; MOSTAFALOU e ABDOLLAHI, 2013). Estes são usados para controlar as pragas, doenças e ervas daninhas que podem atacar as culturas provocando diminuição dos rendimentos das safras e interferindo na qualidade dos produtos, bem como na sua aparência, que na maioria das vezes é um aspecto primordial para os consumidores (DAMALAS e ELEFTHEROHORINOS, 2011; ZHANG et al., 2013; ABDOLLAHZADEH et al., 2015).

Os defensivos agrícolas são produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos destinados ao uso na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens dentre outros, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento, desde que não prejudiquem a saúde e o meio ambiente (BRASIL, 1989).

Os defensivos estão sendo utilizados em larga escala em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento como é o caso do Brasil que é considerado o maior consumidor de defensivos agrícolas desde 2009 (FARIA et al., 2007; INCA, 2015). De acordo com informações da Agência Embrapa de Informação Tecnológica (AGEITEC) anualmente são usados no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de defensivos e o consumo no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas/ano. O consumo desses produtos difere nas várias regiões do país, tendo sido mais usados nas regiões Sudeste (cerca de 38%), Sul (31%) e Centro-oeste (23%) (AGEITEC, 2009).

No cenário da agricultura brasileira, a região do Alto Paranaíba é considerada um polo da produção agrícola, com aplicação de alta tecnologia em todas as etapas do sistema produtivo. Concomitantemente ocorre o uso de defensivos para o controle de pragas que atacam as lavouras. Os principais cultivos dessa região são de café, soja, milho, alho, cenoura, feijão, cebola, batata, trigo, dentre outras. Parte da produção abastece o mercado interno (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,

Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Ceará, Amazonas, Tocantins) e parte é destinada à exportação (ANDRADE et al., 2011).

Diante do exposto, uma das consequências do uso dos defensivos são seus efeitos adversos para a saúde humana, dentre eles as intoxicações por estes produtos. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX) os casos de intoxicação por defensivos em geral na região Sudeste foram 5933 casos (52,42%), sendo que 1326 (11,94%) ocorreram em Minas Gerais. Os óbitos registrados em consequência dessas intoxicações foi de 58 (39,73%) e destes 19 ocorreram em Minas Gerais (SINITOX, 2011).

A exposição aos defensivos agrícolas pode ocorrer através de múltiplas rotas, tais como: exposição ocupacional (inalação, absorção cutânea e ingestão), exposição ambiental (contato com o ar contaminado), e por meio da ingestão de alimentos e água contaminados (LEMUS e ABDELGHANI, 2000; LIMA et al., 2001; HERNÁNDEZ et al., 2013). Na exposição por inalação os sintomas iniciais mais comuns de intoxicação são caracterizados por dores no tórax, dispneia e dores de cabeça, aliadas à visão turva e olhos lacrimejantes, enquanto na exposição por ingestão os principais sintomas são vômitos, diarreias e câimbras. Na exposição dérmica (absorção cutânea) os sintomas mais observados são contrações musculares e sudorese (LIMA et al., 2001).

Na exposição por inalação os sintomas iniciais mais comuns de intoxicação são caracterizados por dores no tórax, dispneia e dores de cabeça, aliadas à visão turva e olhos lacrimejantes, enquanto na exposição por ingestão os principais sintomas são vômitos, diarreias e câimbras. Na exposição dérmica (absorção cutânea) os sintomas mais observados são contrações musculares e sudorese (LIMA et al., 2001).

Em geral, as consequências do uso de defensivos agrícolas são condicionadas por fatores intrinsecamente relacionados tais como: alta toxicidade de certos produtos, falta de utilização de equipamentos de proteção e a precariedade dos mecanismos de vigilância. Esse quadro é agravado pelo nível socioeconômico, educacional e cultural da maioria dos trabalhadores rurais (OLIVEIRA et al., 2001). Sabe-se que embora o uso seja regulamentado e deve ser prescrito por responsável técnico, o mesmo pode ocorrer de forma indiscriminada acarretando um significativo número de intoxicações agudas ou crônicas, além do aumento de doenças associadas, como o câncer, problemas neurológicos, dentre outras.

A intoxicação por defensivos agrícolas, desencadeada por contato direto, geralmente acomete os agricultores, já a intoxicação por contato indireto pode ser constatada entre os demais habitantes da região agrícola, como também entre os consumidores dos produtos.

Embora a exposição aguda seja facilmente detectada e diagnosticada, o mais preocupante são os efeitos resultantes da exposição crônica aos defensivos, visto que, as doenças crônicas associadas ao uso dos mesmos são caracterizadas por lenta progressão, em longo prazo e a baixas doses, sendo difícil a percepção dos sintomas pelos trabalhadores, o que compromete a busca pelos serviços de saúde (HERNÁNDEZ et al., 2011; ANDEF, 2013). Bochner (2007) ressalta que, no Brasil, não há registros oficiais sobre os efeitos crônicos causados pelo contato com os defensivos agrícolas.

O uso excessivo dos defensivos pode desencadear alterações enzimáticas no organismo humano, sendo assim, muitos pesquisadores têm procurado correlacionar a atividade de diferentes enzimas aos efeitos prejudiciais causados por essas substâncias. As enzimas mais estudadas têm sido as colinesterases (AZMI et al., 2006), assim como enzimas hepáticas, Transaminase Glutâmico-Pirúvica (TGP), Transaminase Oxaloacética (TGO) e Fosfatase Alcalina (FA) utilizadas como biomarcador a essas exposições (CALDAS, 2000).

A avaliação por meio dos biomarcadores auxilia na demonstração de que a exposição excessiva possui significado clínico ou toxicológico próprio e pode estar associada a um efeito ou uma disfunção do sistema biológico avaliado (AZEVEDO e CHASIN, 2003).

A acetilcolinesterase (AChE) é uma dessas enzimas e atua como um biomarcador para a exposição crônica em seres humanos (HERNÁNDEZ et al., 2013; GARCIA et al., 2016) expostos há alguns defensivos que possuem alta toxicidade ocasionando a sua inibição em organismos vivos (ZHANG et al., 2013). A inibição da acetilcolinesterase leva ao acúmulo de acetilcolina e butirilcolina no organismo. A partir desse acúmulo surgem os sinais de intoxicação aguda como os efeitos colinérgicos exacerbados e crônica com os efeitos neurotóxicos (CANTARUTTI, 2005; MURUSSI et al., 2014). Porém, os sintomas se desenvolvem somente depois de uma redução de 40% a partir dos valores basais, e os sintomas graves ocorrem caracteristicamente com uma queda superior a 80%. Assim, os sintomas frequentemente ocorrem com valores de pseudocolinesterase dentro da amplitude de referência (DUFOR et al., 2008).

O fígado é um órgão-alvo afetado no caso de exposição aguda e crônica aos defensivos agrícolas. Por conseguinte, as alterações na função do fígado podem ser indicadores sensíveis

de reações tóxicas induzidas por estas exposições (NUNEZ et al., 1998). Ele possui diversas funções e dentre elas a de desintoxicar o organismo excretando substâncias não ativas, assim consequentemente, poderá ocorrer mudanças nos parâmetros hepatológicos após a exposição aos defensivos. A disfunção hepática é refletida pelo aumento dos níveis da transaminase oxaloacética (TGO), transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) e fosfatase alcalina (FA) (GARCIA et al., 2016). O aumento da atividade sérica dessas enzimas é frequentemente o primeiro indicativo da presença de lesão hepática (DUFOR, 2008).

No estudo de Azmi et al. (2006) foi observado valores elevados de atividade das enzimas TGO, TGP e FA em trabalhadores com maior exposição a defensivos agrícolas, sendo o valor de atividade mais elevado encontrado para enzima TGP (271 U/L). Esse valor é aproximadamente sete vezes maior que o valor de referência (até 40 U/L). Esses mesmos trabalhadores apresentaram valores altos de resíduos de defensivos agrícolas (cipermetrina, diazinon e DDT) no sangue. O valor de atividade mais elevado encontrado para a enzima TGO entre os trabalhadores foi 483 U/L, contrastando com o valor de referência de até 37 U/L, sendo que este mesmo trabalhador apresentou níveis elevados dos defensivos agrícolas cipermetrina, DDT e DDE. O maior valor de atividade para a enzima FA foi de 231 U/L, contrastando com o valor de referência de 30-90 U/L, sendo que este trabalhador apresentou níveis altos dos defensivos cipermetrina, diazinon e DDT. Esses trabalhadores também relataram sintomas clínicos como disfunção renal, sensação de queimação na urina, dificuldade de respirar, dor de cabeça e infecção do trato respiratório. Murussi et al. (2004) relataram inibição de atividade da enzima acetilcolinesterase em trabalhadores expostos a defensivos agrícolas, em relação ao grupo controle. Diante disso, torna-se importante o monitoramento dos danos causados por defensivos agrícolas a trabalhadores expostos a estes xenobióticos e, principalmente avaliar o uso dessas substâncias por trabalhadores rurais.

Uma das alternativas para prevenir a contaminação e proteger os trabalhadores da exposição aos defensivos agrícolas é o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado e constante durante o manuseio e aplicação dos produtos químicos (FARIA et al., 2007). Além disso, deve-se atentar para o modo de usar e o tipo destinado para cada forma de exposição (REMOR et al., 2009; ANDEF, 2013). Porém, os usos desses equipamentos ora não são frequentes pelos trabalhadores, ora são usados de forma inadequada expondo-o ao contato direto com os defensivos, o que pode causar intoxicação (ASOGWA; DONGO; 2009, NERILO et al., 2014, GARCIA et al., 2016; BANERJEE et al., 2017).

As Boas Práticas Agrícolas (BPA) são conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas aplicáveis na produção, processamento e transporte de alimentos, orientadas a assegurar a higiene, a proteção da saúde humana e do meio ambiente, mediante métodos ecologicamente seguros. Quando aplicadas durante o manejo dos defensivos evitam a exposição aos mesmos, protegendo tanto a saúde do trabalhador, quanto o meio ambiente (MAPA, 2017).

O objetivo deste estudo foi identificar, descrever e analisar o uso defensivos agrícolas, com ênfase na agricultura familiar, por produtores do Alto Paranaíba, MG, como um fator de risco para a saúde. Além de avaliar essa exposição por meio da quantificação dos biomarcadores enzimáticos AChE, FA, TGO e TGP.

## **2 MATERIAL E MÉTODOS**

### **2.1 Seleção da amostra**

A amostra foi composta por dois grupos: grupo 1 (exposto), composto por agricultores familiares, expostos à resíduos de defensivos agrícolas e grupo 2 (controle) composto por indivíduos não expostos diretamente aos produtos químicos.

Tratou-se de um estudo transversal de caráter qualitativo/ quantitativo, realizado com 15 pequenos agricultores pertencentes à agricultura familiar e 5 participantes do grupo controle. Todos os agricultores eram residentes na região do Alto Paranaíba, Minas Gerais.

Para compor o grupo 1 (exposto) foram selecionados trabalhadores rurais da agricultura familiar, residentes na região do Alto Paranaíba que trabalhavam ativamente nos processos de produção agrícola. O levantamento desses trabalhadores rurais foi realizado a partir do cadastro de pequenos produtores rurais assistidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER) constando um total de 1090 produtores. O recrutamento dos participantes ocorreu após consulta ao cadastro dos pequenos produtores rurais assistidos pela EMATER localizada em Rio Paranaíba.

Para a seleção dos trabalhadores foi considerado como critério o fato de serem agricultores familiares ativamente envolvidos com atividades na lavoura, seja plantação ou colheita, assim como preparação e aplicação dos defensivos agrícolas e com idade igual ou superior a 18 anos de ambos os sexos. O grupo controle foi composto por pessoas com 18 anos ou mais, que não tinham exposição direta prévia ou atual a defensivos agrícolas.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (CEP) parecer nº1.561.112. Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

## **2.2 Entrevista**

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, tendo sido utilizado um roteiro semiestruturado elaborado previamente. Foram aplicadas face a face com o intuito de incentivar uma maior capacidade de resposta (Apêndice B). O áudio das entrevistas foi gravado com o auxílio de um gravador de voz e posteriormente transcrito. A participação foi inteiramente voluntária e os entrevistados estavam livres para se recusar a participar sem fornecer justificativa.

As entrevistas foram realizadas na residência do agricultor rural com o intuito de minimizar qualquer constrangimento ou desconforto e permitir conhecer a realidade local. Foram abordados nas entrevistas temas referentes às condições socioeconômicas e de saúde, uso dos defensivos agrícolas, descrição do processo de trabalho e cuidados tomados quando do manuseio dos defensivos. As entrevistas tiveram em média duração de 30 minutos.

## **2.3 Coleta das amostras de sangue**

Para avaliar possíveis alterações das funções dos biomarcadores dos voluntários pertencentes aos grupos exposto e controle foram coletadas amostras de sangue por profissional treinado, com formação para execução desta atividade. As coletas foram realizadas na casa do trabalhador rural, após um período de jejum de 12 h, sendo coletados 10 mL de sangue por punção venosa, em ambiente apropriado e com uso de material descartável. As amostras foram mantidas a temperatura de refrigeração (1 a 5°C) até o momento das análises. Foram mensuradas as atividades das enzimas acetilcolinesterase (AChE), transaminase oxaloacética (TGO), transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) e fosfatase alcalina (FA). Os volumes das amostras restantes foram armazenados a temperatura de congelamento (-18°C) no Laboratório de Análise de Solo e Alimentos (LASA) da Universidade Federal de Viçosa – *campus* Rio Paranaíba para possíveis análises futuras.

A coleta sanguínea do grupo controle foi realizada em suas próprias residências seguindo os mesmos cuidados do grupo exposto.

### **2.3.1 Determinação da atividade enzimática**

A determinação da atividade enzimática foi realizada em Laboratório de Análises Clínicas, utilizando Kits apropriados para cada enzima da Bioclin.

### **2.3.2. Glutamato Oxaloacetato Transaminase (TGO)**

A atividade do glutamato oxaloacetato transaminase (TGO) foi determinada por método espectrofotométrico com auxílio do kit Transaminase TGO (K034), baseado na metodologia de Reitmann e Frankel (1957).

### **2.3.3 Glutamato Piruvato Transaminase (TGP)**

A atividade do glutamato piruvato transaminase (TGP) foi determinada por método espectrofotométrico com auxílio do kit Transaminase TGP (K035), baseado na metodologia de Reitmann e Frankel (1957).

### **2.3.4 Fosfatase Alcalina (FA)**

A atividade da fosfatase alcalina (FA) foi determinada por método espectrofotométrico com auxílio do kit Fosfatase alcalina (K019), baseado na metodologia de Roy (1970) modificado.

### **2.3.5 Acetilcolinesterase (AChE)**

A atividade da acetilcolinesterase foi determinada pelo kit Colinesterase (K094), por meio de análise espectrofotométrica baseado no método enzimático cinético (DGKG).

## **2.4 Tratamentos de dados**

Tratou-se de um estudo de abordagem quantitativa/ qualitativa. Utilizou-se a estatística descritiva para apresentar os dados referentes às condições socioeconômicas, os quais foram expressos em porcentagem e média  $\pm$  desvio padrão.

As entrevistas foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme modelo de Bardin (2006). O modelo é constituído pelas seguintes etapas: 1) pré-análise, 2) exploração do material, 3) tratamento dos resultados, 4) interpretação. Na pré-análise foi realizada a leitura flutuante de todo o conteúdo transcrito das entrevistas e identificados e

selecionados os assuntos as estruturas de relevância que se repetiam nas falas. A exploração do material consistiu na categorização das respostas, as quais foram organizadas em temas segundo cada categoria. Foram elaboradas 5 categorias: 1- Defensivos (temas: terminologia, rótulos, faixas toxicológicas, acondicionamento, embalagens vazias, treinamentos, receituário agrônomo e produzir sem defensivos); 2- Aplicação dos defensivos (temas: responsável pelas pulverizações, forma de aplicação manual ou mecanizada, horário, vento e período); 3- Exposição Ocupacional aos defensivos (temas: inalação, absorção cutânea, visão, cuidados pós exposição e cuidados pessoais após pulverizações); 4- Equipamentos de Proteção Individual (temas: Usos dos EPIs, justificativa de não usar EPIs e cuidados com os EPIs após o uso); 5- Saúde dos trabalhadores rurais (temas: doenças pregressas, tabagismo, medicamentos e preocupação com a saúde em relação ao uso de defensivos). Nas fases de tratamento dos resultados e interpretação foi contabilizada a frequência das informações e feitas inferências e discussões com base na literatura.

Os trechos selecionados das entrevistas foram identificados com a letra E, seguida de um número (E1 a E15), a fim de manter o sigilo.

As concentrações dos biomarcadores foram submetidas ao teste de homogeneidade das variâncias (teste de Hartley) e normalidade dos resíduos (teste de Jarque-Bera), para verificar se atendiam as pressuposições da ANOVA. Em seguida, os dados foram analisados pelo teste F (ANOVA) a 5% de probabilidade.

### **3 RESULTADOS E DISCUSSÃO**

O estudo foi conduzido com o intuito de perceber as atitudes, comportamentos e perspectivas quanto ao uso de defensivos agrícolas entre agricultores, especialmente familiares, do Alto Paranaíba. Tratou-se de uma tentativa de identificar as lacunas nos seus conhecimentos e nível de conscientização sobre os perigos e riscos para a saúde quando do uso desses produtos. Nesse contexto, observou-se que os agricultores empregam diferentes termos como sinônimo de “defensivo”, sendo os mais comuns: remédio, produto, veneno e agrotóxico.

Todos os agricultores entrevistados (n=15) eram do sexo masculino, isso é justificado pelo fato das operações de pulverização serem realizadas por homens. A idade dos entrevistados variou de 31 a 66 anos, com idade média de 53,13 anos. Cerca de 66,7% tinham até 4 anos de estudos completos e 6,7% até 10 anos completos, como mostrado na Tabela 1.

**Tabela 1:** Dados demográficos dos agricultores familiares do Alto Paranaíba

<b>Variáveis selecionadas</b>	<b>%</b>
<b>Amostra total (15)</b>	
<b>Sexo</b>	
Masculino	100,0
Feminino	
<b>Distribuição (faixa etária)</b>	
30 – 39	6,7
40 – 49	20,0
>50	73,3
<b>Escolaridade (anos completos de estudo)</b>	
1 ano	6,7
2 anos	13,3
3 anos	6,7
4 anos	40,0
5 – 8 anos	26,6
10 anos	6,7

A renda familiar média foi de aproximadamente 3,7 salários mínimos mensais. Os agricultores eram tipicamente pequenos proprietários, com área plantada média de 11,2 hectares. A maioria dos entrevistados exercem suas atividades agrícolas desde crianças auxiliando os pais, com uma experiência média de 34,8 anos nos trabalhos voltados para a agricultura. Dentre os entrevistados, 80% vive apenas dos rendimentos agrícolas das famílias e 20%, além de exercerem suas atividades no campo, também exercem outras atividades externas. A parcela dos rendimentos não agrícolas das famílias (33,3%) confirmou que a agricultura era a principal atividade dos agricultores.

A principal cultura informada pelos agricultores era o café (65%), seguido pelo maracujá (20%), milho (10%) e tomate (5%). Observou-se que alguns agricultores (26,6%) entrevistados cultivam duas culturas (café e maracujá) concomitantemente.

Os defensivos mais utilizados pelos agricultores possuem as faixas toxicológicas indicadas pelas cores verde, azul e amarela, as quais são consideradas menos tóxicas por eles. “O vermelho é o mais tóxico, o marelo já é menos tóxico como se diz e o azul que já é...mas de boa né”. (E10). Os defensivos com faixa toxicológica de cor vermelha eram usados com menor frequência, especialmente em casos onde há urgência de controle de pragas/doenças “Num é rótulo vermeio, é raridade ocê usar, só se usa se uma coisa muito de emergência assim procê resolver rápido assim, uma praga coisa assim.” (E 9). Segundo eles, os rótulos vermelhos são

mais agressivos, perigosos e tóxicos, por isso o uso é raro. Em consonância com nosso estudo, Jallow et al. (2017) também verificaram que se um defensivo não é eficaz é substituído por outro de maior toxicidade e potência. A toxicidade dos defensivos é a capacidade dessas substâncias causar efeito adverso à saúde e para compreender o risco que eles podem causar o Ministério da Saúde/Anvisa estabeleceu os critérios de classificação toxicológica onde a faixa vermelha corresponde à extremamente tóxica, amarela à altamente tóxica, azul (mediamente tóxico) e verde (pouco tóxico). Como não é possível alterar o nível de toxicidade do produto, a maneira de reduzir o risco de contaminação é, conseqüentemente, diminuir a exposição ao mesmo, através do manuseio correto dos defensivos, uso de equipamentos calibrados e em bom estado de conservação e uso do EPI adequado e descontaminado (ANDEF, 2013). Vale ressaltar que os defensivos de faixa amarela são comumente utilizados pelos produtores e os mesmos não o consideram altamente tóxicos.

Ainda, houve relatos que há uma preocupação em não aplicar defensivos com alta toxicidade em virtude de exigências mercadológicas, sendo a cooperativa, a responsável por indicar o defensivo mais apropriado. Também foi evidenciada uma maior preocupação quanto à aplicação de defensivos com faixa toxicológica vermelha, uma vez que essa cor caracteriza alto potencial de toxicidade, refletindo numa preocupação maior quanto ao uso de EPI.

O nível de exposição dos agricultores aos defensivos variou entre os que participavam das pulverizações usando todo o EPI (20%), os que participavam, porém usavam apenas partes do EPI (53,3%) e os que aplicavam e não usavam o EPI (26,7%). O tempo de exposição a esses produtos variou de 8 a 55 anos, sendo o tempo de exposição semelhante ao tempo de experiência com a agricultura.

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a agricultura familiar é aquela que consiste no emprego da mão-de-obra predominantemente familiar, tanto de mulheres quanto de homens, no setor de produção de alimentos, tendo importante papel socioeconômico, ambiental e cultural, necessitando de acesso à tecnologia e a serviços de extensão dentre os fatores importantes para o seu bom desenvolvimento (FAO, 2014). No presente estudo, 86,7% dos entrevistados relataram que as atividades agrícolas desenvolvidas eram realizadas pela mão-de-obra familiar, que incluía esposo, esposa e filhos. Estes executavam as atividades desde o plantio, cuidados diários, colheita até a entrega para a comercialização. Apenas 13,3% (Tabela 2) não executavam as operações de pulverização, por

não dispõem dos equipamentos necessários e pelo receio de aplicar os defensivos por serem perigosos.

As pulverizações ora eram realizadas pelos próprios produtores (86,7%), ora por terceiros contratados. O ato de pulverizar era considerado prazeroso por alguns agricultores “[...] eu gosto de fazer, é um dos trabalhos que eu tenho prazer de fazer [...] eu percebo que o trem pegou ou não” (E7), enquanto que outros o faziam por obrigação, pois era visto como um produto perigoso para contratar alguém para realizar “[...] esses trem é perigoso, pra gente pô uma pessoa pá ruma pá gente.” (E2). Os produtores que contratavam terceiros pagavam pelo serviço pelo receio de intoxicação, pois consideram os defensivos fortes, além de não contarem com maquinário para realizar a pulverização.

**Tabela 2:** Práticas de trabalho relatadas pelos agricultores familiares do Alto Paranaíba referentes à aplicação de defensivos agrícolas

Variável de exposição ocupacional	%
Aplicação de defensivos	86,7
Possui treinamento para a aplicação dos defensivos	26,6
Não possui treinamento, mas já participou de palestras	40,0
Lê os rótulos dos defensivos	60,0
Raramente lê os rótulos	13,4
Aplicam conforme receituário agrônômico	66,7

Em geral, os defensivos eram pulverizados com o auxílio de trator com tanque acoplado e, em alguns casos, como por exemplo, quando as plantas estavam em fase inicial de desenvolvimento, eram pulverizadas com bomba costal. Os agricultores salientaram que a presença de vidros nos tratores era uma forma de proteção contra a exposição aos defensivos “eu vou compra um novo pra dá uma proteção a mais né, pra gente tamém né, de cabine fechada né, mesmo ocê usano equipamento, é uma proteção maior ainda” (E9). No entanto, os tratores utilizados pela maioria não possuíam cabines protegidas por vidros. Alguns possuíam apenas vidros laterais e frente sem proteção e muitos não tinham proteção alguma.

Os horários preferenciais informados para a realização das aplicações eram no início da manhã ou no final da tarde, pois havia maior absorção e aproveitamento dos defensivos pelas plantas “Sempre tarde, pelo lado da boca da noite, mais fresco. Mais fresco e ota tamém sabe,

planta absorve [...] quando tá quente a planta se fecha [...] procurar as partes mais frescas, procê tá aplicando o remédio porque a planta tá aberta, ela absorve mais, o remédio, o remédio faz mais efeito, ocê entendeu?” (E9); “Ou de manhã ou a tardezinha, sempre no horário fresco. É porque parece que eu num sei, parece que a noite a planta agradece [...]” (E10).

Houve agricultores que salientaram que desperdiçariam os defensivos se estes fossem aplicados durante o dia. “Porque nesse calorão tem que, que, o produto é caro, não faz efeito né, o calor tá demais” (E11). Se as pulverizações ocorrerem no meio do dia, período em que o calor é mais intenso, pode haver a evaporação do produto como explica um agricultor “No meio do dia é ruim porque pode evaporar muito por causa do sol quente.” (E6). Outro agricultor completa que “No meio do dia não, prejudica a pranta né, prejudica a pranta.” (E4). Portanto, as condições climáticas no momento da aplicação, tais como alta temperatura, podem provocar a volatilidade química do defensivo causando evaporação mais rápida, seu possível desperdício. Ainda, pode haver aumento da taxa de transpiração do corpo humano, interferindo no uso do EPI pelos agricultores como foi relatado por eles e também afirmado por Surgan e Condon (2010) e igualmente observado por Fenske e Day (2005).

Os agricultores relataram que o vento ideal para realizar a aplicação é de no máximo aproximadamente 5 Km/h, quando segundo eles, o ar está “praticamente parado”. Isso porque além do contato com os defensivos ser perigoso, aproveita-se mais deles que são de alto custo “[...] o vento pára bastante né e aproveita os defensivos né, os produtos pruveita mais e bão pra gente tamém né, porque não tano ventano ocê num toma muito veneno” (E15). Evita-se também o incômodo gerado às pessoas no entorno “Não adianta falar que não vem com o vento ocê vai prum lado, bão, a hora que ocê volta o vento pega, né, aí leva o produto” (E1). O vento aumenta consideravelmente a deriva da pulverização e a exposição resultante ao aplicador, visto que a quantidade de defensivo perdida da área alvo e a distância que percorrerá depende da velocidade do vento. Portanto, além da exposição do aplicador, o meio ambiente e também as pessoas que estão ao redor são expostos aos resíduos de defensivos, daí a importância de observar a velocidade do vento para realizar as aplicações (ANDEF, 2013). No presente estudo ficou evidente a preocupação dos agricultores com o desperdício dos defensivos e uma minoria ressaltou a preocupação com a própria exposição a eles. Portanto, as condições climáticas ideais para as pulverizações são umidade relativa do ar mínima de 50%, velocidade do vento de 3 a 10 Km/h e temperatura abaixo de 30°C, qualquer alteração nesses fatores podem determinar a interrupção da pulverização (ANDEF, 2013).

O período que demanda maior frequência de pulverizações, segundo o relatado, é no das chuvas (verão), em virtude de maior incidência de doenças e pragas nas plantações “É direto. É nas água né” (E4).

A participação em cursos diretamente voltados à aplicação de defensivos foi relatada por 26,6% dos agricultores. Embora esse percentual seja pequeno, o motivo que leva a participação foi relatado por um agricultor o qual comentou entusiasmado sobre a importância de estar sempre atualizando os conhecimentos: “Produzino mais, mais porque isso? Eu... eu num perco uma palestra, tem uma lá em Barril, eu vou lá, lá em Uberlândia vô, Coopadap vô, participo de tudo.” (E14). Foi perceptível que os agricultores que se envolvem e participam de treinamentos tem comportamentos ambientalmente saudáveis no controle das pragas, eram mais propensos a conhecer a informação técnica e fazer uso dos defensivos de forma eficaz e segura, bem como a usar métodos alternativos no controle de pragas como o Manejo Integrado de Pragas. Jallow et al. (2017) também relataram a maior sensibilidade do agricultor informado em usar eficientemente os defensivos, buscando muitas alternativas, como o Manejo Integrado de Pragas. Khan e Damalas (2015) averiguaram que os agricultores que participam de treinamentos utilizam formas mais saudáveis para o controle de pragas no Paquistão.

A participação em palestras na cooperativa a que são associados e o seguimento das orientações repassadas pelos agrônomos que prestam assistência técnica foi informada por 40% dos agricultores. Notou-se que a assistência técnica prestada pelos agrônomos vinculados à cooperativa era uma importante fonte de informação para as medidas a ser tomadas quanto ao uso de defensivos, o que foi confirmado também no estudo de Jallow et al. (2017) que contou com a participação de 250 produtores selecionados aleatoriamente no Kawait para quantificar a extensão do uso de defensivos, suas percepções de risco e fatores que influenciam seus comportamentos no uso de defensivos. Porém, a falta de interesse em participar dos treinamentos também foi evidenciada nas entrevistas, uma vez que alguns agricultores se encontraram desmotivados. “Eu num fui assim em reunião não, até me chamaram várias véiz, sabe. Mas agente num vai, né. [...]Ah, a gente as veiz apertado né, num tem tempo né. Ah! Num vô não, já teve muitas reunião assim na região aqui sobre produto né.” (E4). A participação em eventos direcionados a vida no campo e, principalmente, a aplicação de defensivos é de extrema importância para ganho e atualização dos conhecimentos. Muitas contaminações ocorrem devido a ações desencadeadas pela falta de conhecimento e poderiam ser prevenidas com, por

exemplo, o uso adequado dos EPI, lavagem adequada dos EPI e observância de fatores climáticos, temas esses tratados nos treinamentos.

Em relação à leitura dos rótulos dos defensivos, 60% dos agricultores os liam (Tabela 2) com o intuito de saber para qual finalidade eram indicados, qual doença combatia, dosagem, cuidados com a saúde e a sua toxicidade. “Sempre lê, sempre nós lê, pra vê quê que é, como é que é, pra quê que é, né, pra quê serve, quantas doenças.” (E2).

Houve também aqueles que seguiam apenas os receituários prescritos por profissionais técnicos e não realizavam a leitura dos rótulos, relatando não se preocuparem, uma vez que já tinham a “receita”. O agricultor E6 explicou: “Não, aí o agrônomo já passa a receita né. Já vem certinho, tem receita, tem o nome do produto, aí ocê não precisa nem lê, porque aí tá a receita já.” No entanto, a preocupação reside nos cuidados quanto à aplicação e o manuseio adequado dos defensivos, os quais não são prescritos no receituário agrônômico. Essas informações são disponibilizadas apenas no rótulo do produto, o que favorece a exposição dos trabalhadores aos defensivos. Exposições estas que tendem a aumentar dada a falta de conhecimento sobre as instruções de como usar os defensivos, afirmam Damalas e Eleftherohorinos (2011).

Uma das justificativas para essa conduta que merece ser enfatizada trata-se da baixa escolaridade e, portanto, da dificuldade de leitura das informações contidas nos rótulos. “Lê assim pra mim, mais é mal né, é poca coisa.” (E8). Nesse contexto, constata-se que o analfabetismo limita a capacidade de compreensão dos rótulos dos defensivos, que contemplam informações sobre os cuidados no armazenamento, uso de EPI e precauções a serem tomadas para evitar a exposição. Resultados semelhantes foram também descritos por Damalas, Theodorou e Georgiou (2006), Zadjali et al. (2015) e Fan et al. (2015).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014) a taxa de analfabetismo no país decresceu de 11,5% (2004) para 8,3%. Na região Sudeste também houve diminuição de 6,6% para 4,6%. O grupo de idade cuja taxa de analfabetismo é maior situa-se entre os 40-59 anos de 9,2%. A média nacional de anos de estudo para mulheres é de 8 anos e para homens 7,5 anos e na região Sudeste a média de ano de estudos é de 8,4 anos. Neste contexto a população do nosso estudo estava abaixo da média nacional e também da região Sudeste, como mostra a Tabela 1, onde mais da metade dos agricultores (66,7%) estudaram 4 anos ou menos.

Segundo os agricultores, geralmente os rótulos contêm palavras de difícil compreensão, as fontes das letras deveriam ser maiores, para proporcionar melhor visualização, as

informações deveriam ser simplificadas e legíveis, como evidenciado em um comentário: “Outra coisa também que tem que fazer também, são as letras maior também, as letras é muito pequeninha. Aquelas informação que eles não quer te informa, anãoooo é óio de mosquito. ” (E14).

A maioria dos produtores (66,7%) não aplica nenhum defensivo sem a receita agrônômica, seguindo rigorosamente o que foi prescrito, conforme determinado pela legislação em que a prescrição e orientação técnica para a utilização do defensivo deve ser prestado pelo profissional legalmente habilitado (BRASIL, 2002). “A gente não passa nada sem receita não. Tem que ter, eis lá passa e a gente passa aqui” (E1). Todos os agricultores que são cooperados relataram receber assistência técnica do engenheiro agrônomo vinculado à cooperativa, sendo eles responsáveis pela lavoura e pela produção, visto que os produtos são vendidos para a cooperativa.

Entretanto, houve produtores (33,3%) que relataram que, em virtude da vivência, dos muitos anos de experiência com a cultura e dos conhecimentos adquiridos sobre dosagem, defensivos e doenças, apenas compram os produtos e aplicam nas lavouras e, em meio a risos, se consideram agrônomos. “[...] eu vou ser sincero com ocê [...] comecei com café com 15 anos. Então hoje, assim muitas das vezes é...eu nem chamo o agrônomo pra ir lá oiá, porque são coisas que a gente aprendeu com o agrônomo, hoje ocê caba, caba sendo o agrônomo dentro do seu terreno, porque ocê vai no meio da lavoura, ocê anda no meio da lavoura ou de repente ocê depara...[...] Ah, virou um agrônomo né (risos)” (E9).

No caso de aparecimento de uma nova doença ou desconhecimento de um novo produto, os agricultores procuram a assistência técnica nas cooperativas ou se informam nas lojas onde os defensivos são vendidos. “[...] Faço, faço eu sei a gente conhece no dia a dia só se fô assim, um produto novo que cai no mercado aí que a gente não conhece mais assim eu nunca deixo o certo pro duvidoso [...] a gente tem um agrônomo que acompanha a gente.” (E9) As tomadas de decisões em relação aos defensivos, por parte dos agricultores também foram relatadas nos estudos de Abdollahzadeh et al. (2015) cujo índice de procura aos serviços de extensão foi de apenas (13,9%) e Jallow et al. (2017) em que os serviços de extensão foram os menos procurados (24%) para o controle das pragas.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são indispensáveis para a proteção do trabalhador durante o processo de pulverização, desde o preparo da calda até a higienização dos equipamentos utilizados durante a pulverização. O seu uso é de vital importância em ambientes

que oferecem riscos à saúde e integridade física do trabalhador. Além disso, é responsabilidade do trabalhador usar o EPI e substituí-lo quando apresentar algum defeito (ANDEF, 2013). Os defensivos podem representar um grande perigo ao trabalhador que exercem funções nos setores agrícolas ao qual é inserido e os EPI exercem proteção contra o contato direto com esses produtos que resultariam em exposição ocupacional (inalatória, oral, ocular e dérmica) colocando em risco a saúde. O uso correto dos EPI durante a aplicação dos defensivos pode reduzir significativamente a incidência de problemas de saúde relacionados com a exposição a esses produtos (GARCIA et al., 2016). Vale ressaltar que é de extrema importância a realização de treinamentos para orientação sobre as melhores técnicas de uso e também de sua conservação, pois as maiores contaminações ocorrem pelo uso inadequado desses equipamentos (ANDEF, 2013). Os EPIs devem possuir o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (BRASIL, 1977) e a Portaria 121 do MTE (2009) determinou critérios para a realização de ensaios para atestar a qualidade das vestimentas.

No entanto, a falta de uso ou uso incompleto de EPI foi informada por 80% produtores (Tabela 2) “Usava nada, sempre assim, butina, essas roupa simples memo, nem máscara nem nada. Nem luva nem nada.” (E3); “Num é que eu uso direto” (E2); “[...] alguma coisinha as veiz escapa né. Porque é coisinha mínima né” (E4). O uso incompleto do EPI também foi encontrado no estudo de Banerjee et al. (2017) onde os produtores ignoraram a natureza tóxica dos compostos e muitos deles (26,7%) não utilizavam quaisquer medidas de proteção durante as pulverizações. O estudo de Garcia et al. (2016) revelou que a maioria dos trabalhadores não usavam o EPI durante as operações de mistura e aplicação dos defensivos, apresentando um risco aumentado de exposição como a mistura sem luvas, ocorrendo com isso, o aumento da absorção cutânea de defensivos, sendo que a pele é a mais importante rota para a exposição ocupacional aos defensivos.

**Tabela 3:** Uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelos agricultores familiares do Alto Paranaíba durante o preparo e aplicação dos defensivos agrícolas

Variável de exposição ocupacional	%
Usa EPI completo	20,0
Usa EPI incompleto	53,3
Uso da roupa	73,3
Máscara	66,7
Luva	53,3
Botas	66,7
Óculos	33,3

Para alguns dos entrevistados o uso dos EPI depende da toxicidade do produto a ser aplicado “assim quando eu vou passar, eu uso mais quando eu vou passar produto, veneno né, porque esses outros, foliar essas coisas é mais leve né, mais tranquila (risos)” (E2); “você vai acrescentando EPI de acordo com a gravidade do produto, se o rótulo falar uma coisa aí ocê se empiriquita todo né fica parecendo um robô né.” (E7).

Quando os EPI's eram usados, os itens mais citados foram roupa, a bota e máscara, valendo ressaltar que alguns destes não foram utilizados com a finalidade de proteger o trabalhador contra a ação de defensivos agrícolas. Os itens menos utilizados incluíram os óculos (33,3%) e a luva (53,3%). Segundo a ANDEF (2013) o uso da luva é muito importante, pois protege uma das partes do corpo com maior risco de exposição que são as mãos. O não uso dos EPI foi justificado pelos entrevistados pelos desconfortos acarretados pelos mesmos “luva é muito é muito ruim, muito grossa (...) pesada, ela não dobra direito” (E1 “É o calor né, a temperatura que fica né. Que ela é uma roupa meio encerada sabe?” (E4); “[...] a gente fica muito abafado né, soa muito, sente muito calor, muito calor. Aquelas roupas esquenta a gente demais.” (E13). Zadjali et al. (2015) igualmente relataram as razões para a não utilização de luvas e máscaras, devido o desconforto causado pelas altas temperaturas. Também no estudo de Garcia et al. (2016), os trabalhadores relataram que devido à alta temperatura o uso de EPI era impraticável.

Os agricultores relataram que além do desconforto térmico e físico e da dificuldade de movimentação, sofrem com a impossibilidade de visualização em algumas situações “[...] vorta e meia tá embaçando aquilo que me irrita aquele trem, sabe” (E9), com a falta de tempo “A

pressa... ainda mais a gente que num tem tempo, poco tempo” (E13) e com a aparência desagradável “Aí a gente usa luva, usa máscara, usa óculos, fica até horroso de vê, tampa tudo até a cabeça, o rosto tudo sabe.” (E11).

Foi notório perceber que os agricultores tinham consciência de que o não uso dos EPI poderia ocasionar problemas de saúde e se consideravam responsáveis por isso “um pouco é descuido da gente, a gente podia isolar um pouco né.(...)” (E1); “hora que o vento joga pá riba da gente, o corpo da gente vem muito com remédio, pega muito remédio sabe, trem brabo né, mais eu vou compra a roupa certa.” (E9); “se num usa é porque agente falta com o dever” (E2). Resultado semelhante foi também averiguado por Jin et al. (2017) que avaliou as práticas agrícolas de pequenos agricultores em relação ao uso de defensivos e identificou os determinantes de seus comportamentos no Condado de Anqiu, na China. Segundo Abdollahzadeh et al. (2015), o alto risco de uso de defensivos para a saúde humana foi percebido entre os produtores como o efeito negativo mais grave. A utilização de equipamentos para pulverizações adequados e bem conservados, juntamente com a tomada de precauções necessárias em todas as fases do manuseamento dos defensivos, pode minimizar a exposição humana aos agentes químicos e seus potenciais efeitos nocivos para a saúde e meio ambiente, como afirma Damalas e Eleftherohorinos (2011). Para a escolha correta dos EPIs deve-se proceder a leitura atenta do rótulo/bula dos produtos que sempre informam sobre o seu uso e para garantir a proteção adequada os EPIs devem ser vestidos e retirados da forma correta. (ANDEF, 2013).

Em relação aos cuidados tomados com os EPI após as pulverizações, foram citadas a lavagem com água e sabão, de forma separada das demais vestimentas dos moradores da residência “Lava separado né e ruma seca, no...no arame de novo, né.” (E4) e armazenamento em local específico para esse fim (barracões/depósito) “[...] depois ponho pra lá, no barracão” (E1). Em geral, a lavagem dos EPI é um processo realizado tanto em local distante da residência (roça), quanto no tanque da área de serviços do domicílio “Ah, isso aí é a muié que lava né, eu nem sei (risos)” (E12). Segundo a ANDEF (2013) a limpeza dos EPIs deve ser realizada sempre após a jornada de trabalho lavando-se separadamente das roupas comuns, inclusive em outro lugar, com água e sabão, usando luvas e jalecos para proceder à lavagem, não utilizar detergentes alvejantes, não deixar de molho ou esfregar e após a secagem guardar separados das roupas comuns para evitar a contaminação. Os agricultores relataram que o principal motivo

para a lavagem é o odor desagradável apresentado pelos equipamentos em virtude do uso dos defensivos e a preocupação em remover os resíduos dos produtos utilizados.

Vale salientar que a frequência da lavagem variou “de logo após a pulverização” (E7) a “mais vezes de uso” (E11), nesse último caso para que os EPI possam ter maior vida útil “[...] então cê nem precisa lava com frequência né, então lava menos eh... eu acho que guenta mais então aí é mais” (E11). Em casos em que as pulverizações são realizadas em dias seguidos, é comum que os EPI sejam deixados no trator como relatou um agricultor “se eu for pulverizar hoje e amanhã eu vou continuar aí eu já deixo no trator” (E15). Ressalta-se que os agricultores informaram que usavam os EPI várias vezes sem realizar suas lavagens, tendo sido observado que o objetivo principal era a remoção de sujidades e não necessariamente de resíduos dos produtos ali depositados “[...] se não tiver chovendo ele fica sequinho, não xuja de barro, num xuja... então cê nem precisa lava com frequência né, então lava menos [...]” (E11). Portanto, o uso inadequado dos EPI ou seu mau estado de conservação podem contribuir para a exposição ocupacional dos agricultores aos defensivos, que como notamos nesse estudo não segue corretamente estas orientações.

No preparo e aplicação dos defensivos é comum o seu contato com a pele, seja pela dispersão de gotas de calda pelo vento, seja em virtude da dificuldade de manuseio, o que faz com que a solução espirre e caia sobre a pele. Derramamentos acidentais de produtos químicos seja por vazamentos, ou em virtude de equipamentos de pulverização defeituosos, também foram destacados por Damalas e Eleftherohorinos (2011) como uma das diversas situações, as quais o trabalhador pode estar exposto. Surgan e Condon (2010) destacaram que os líquidos são propensos a névoas e ocasionalmente derramamento, resultando em contato direto com a pele ou contato indireto através da contaminação da roupa, assim como foi ressaltado pelos agricultores do presente estudo, que relataram que eventualmente ocorria essa exposição.

As medidas de proteção inadequadas, como a ausência da luva, levam ao desenvolvimento de sinais e sintomas de intoxicações nas propriedades, caracterizadas por ardência e vermelhidão, o que se assemelha aos resultados de Banerjee et al. (2017). “Descuido” e “vacilo” foram as palavras utilizadas pelos produtores para justificar o contato não intencional com os defensivos. Brisbois (2016) também encontrou argumentos semelhantes onde a exposição aos pesticidas era atribuída por muitos participantes ao descuido, incluindo o uso inadequado de EPI, como luvas e máscaras.

Notou-se ainda, a dificuldade dos entrevistados em dizer que os defensivos já entraram em contato com a pele, o que pode ser verificado nas seguintes frases: “Não, que eu lembro não. Às vezes até já aconteceu, às vezes, mas eu corro e lavo na água corrente com sabão.” (E10) e “Quem falar que nunca caiu está mentindo, cai sim” (E11).

**Tabela 4:** Práticas de higiene e condições de saúde dos agricultores do Alto Paranaíba

<b>Variável de exposição ocupacional</b>	<b>%</b>
Teve contato direto com o defensivo na pele	100,0
Toma banho após as aplicações	53,3
Hábito de fumar	17,6
Sentiu-se mal após aplicação de defensivos	60,0
Crê que os defensivos faz mal à saúde	80,0

Os participantes apontaram o contato direto com os defensivos, por meio das mãos ou rosto (nariz e olhos), como sendo a principal preocupação em relação aos efeitos deletérios para a saúde dos mesmos, principalmente no que se refere aos efeitos agudos como a intoxicação, já os efeitos crônicos não foram citados. Os efeitos agudos são mais perceptíveis ao agricultor, pois os sinais e sintomas aparecem rapidamente após a contaminação com defensivo, ao contrário dos efeitos crônicos que não são perceptíveis em curto prazo. Segundo Nerilo et al. (2014), os efeitos da exposição aos defensivos em longo prazo e em baixas concentrações são difíceis de diagnosticar, pois incluem resultados de saúde em tempos diferentes e específico dependendo do defensivo e do perfil de exposição, incluindo frequência, duração e método de aplicação e também o uso de EPI.

As exposições ocupacionais aos defensivos, segundo os entrevistados, ocorreram principalmente no local de trabalho, durante as etapas de preparação (abertura dos frascos e mistura da calda) e aplicação (pulverização) dos defensivos, o que corrobora com o estudo de Garcia et al. (2016) que avaliou sinais e sintomas clínicos através do exame físico, hemograma e parâmetros bioquímicos em uma população de trabalhadores exposto e controle. Em uma das falas foi explicitado que ao final do dia de trabalho é comum o retorno para casa com o corpo coberto pelos produtos utilizados. Ainda, em meio a risos, foi relatado por um dos produtores que o não uso dos EPIs frente aos defensivos considerados “mais fracos” é mais perigoso, uma vez que não se tem “medo” dele, por considerá-lo de baixa toxicidade, o que faz com que os EPIs sejam empregados de forma incompleta “[...] mas tem dia que ocê pensa assim o veneno

é mais fraco e vou usar pas, pas metade, mais o veneno, mas o veneno mais fraco é o mais perigoso (risos), ocê não tem medo dele (risos) não foge docê, mas não uso 100% certo não, uso, como diz os otos, pelas metade. Eu falo o que é.” (E11).

Os agricultores relataram possuir algumas doenças pregressas como gastrite, sinusite, isofagite, úlcera duodenal, bronquite alérgica, doença de chagas no coração e no intestino, assim como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hipertensão. O tabagismo e o etilismo não foram frequentes entre os entrevistados, mas houve relatos que o primeiro hábito já havia ocorrido em momentos anteriores da vida, tendo sido constatando que 64,8% dos agricultores nunca tiveram o hábito de fumar, 17,6 % já tiveram o hábito e 17,6% são tabagistas. O uso de medicamentos diariamente é comum, sendo os mais citados omezaprol, pantoprazol, sinvastatina, atenolol, losartana, furosemida, espirolactona e cardilol. Além disso, a maioria dos trabalhadores faz uso de analgésicos para alívio da dor.

Os trabalhadores, de forma geral, demonstraram preocupação com o uso dos defensivos quando relacionados aos riscos para a saúde e demonstraram estar informados quanto aos seus efeitos prejudiciais, conforme também foi averiguado por Fan et al. (2015). As expressões associadas à essa preocupação foram: “prejudicam a saúde”, “sinto muito medo”, “eu tem raiva”, “tem dia que me rupeia”, “o trem num é certo”, “faz mal demais”, “pode causar algum problema no futuro”, “só prejudica”, “olha o tanto de câncer que esses veneno dá”, “perigo de intoxicar” e “vai acumulando”. Esse resultado é um contrassenso em relação ao que foi observado quanto ao uso dos EPI. Embora não tenha sido avaliado, isso pode ser justificado pela possibilidade dos entrevistados se considerarem menos susceptíveis que seus pares a desenvolverem problemas de saúde em virtude do uso de defensivos.

Porém, também foi constatada falta de preocupação por alguns agricultores uma vez que, “[...] quem trabalha vai acostumando, o organismo acostuma, o perigo é para quem não trabalha diretamente com eles.”. Segundo Jallow et al. (2017), a maioria dos agricultores em seu estudo estava bem cientes dos efeitos nocivos dos defensivos em relação a saúde humana, mas, ao contrário do que se esperava, isso não influenciou positivamente nas suas práticas de uso dos defensivos. Sendo que principal preocupação demonstrada nesses casos é se o produto vai agir positivamente sobre as doenças e pragas, pois os defensivos tem custo elevado, como confirma um agricultor “Ah! Eu tenho preocupação com nada não, tenho preocupação que as vez ocê paga caro num produto e ele não fazer efeito. Isso me mata de raiva.” (E1).

A preocupação com a contaminação do solo, da água e dos alimentos também foi mencionada “Eu tenho, eu tenho essa preocupação porque eu sei que vou tá contaminando o solo e eu vou tá contaminando a água que eu tô usando, que minha família usa, que minha esposa usa e de repente até outros que vão usar essa água pra baixo” (E9), no entanto, o uso dos defensivos é justificado por não haver outra fonte de renda e pela produção agrícola não ser suficiente sem o uso desses produtos, conforme também foi encontrado por Jallow et al. (2017) em seu estudo. Essa consciência é importante, pois além da contaminação direta, há a contaminação indireta que ocorre pelo consumo de alimentos e água com limites de resíduos de defensivos superiores ao recomendado pela legislação.

Muitos agricultores (53,3%) relataram sinais ou sintomas agudos de intoxicações como falta de apetite, ardência no rosto, coceira, vermelhidão, feridas e ardências cutâneas, especialmente nas mãos e braços, alergia, ressecamento dos lábios, intoxicação e prejuízo da visão, sendo a dor de cabeça e mal-estar os mais comuns. De forma semelhante, Banerjee et al. (2017) e Jin et al. (2017) encontraram em seus estudos estes sintomas como os predominantes. Segundo os relatos dos entrevistados, os “remédios” são “fedorentos” e “fortes”. O vapor, ao entrar em contato com o rosto, faz com que o “estômago embrulhe”, ocasione “bambazeira, como se tivesse levado uma bordada na cabeça (referência a tontura) e perda do equilíbrio ao caminhar” (E7).

Após a exposição ocupacional aos defensivos é comum a lavagem imediata do local afetado com água corrente. Com o aparecimento dos sintomas, os trabalhadores disseram ingerir água, água com sal ou açúcar, tomar banho “bem tomado”, fazer uso de medicamento (analgésico) e esperar os sintomas “passarem” como enfatizado por um agricultor: “Tomou água de sal. Água de sal corta, né.” (E5). Foi observado que 80% dos entrevistados não procuram atendimento médico, pois não consideram necessário, mas sim que é uma situação passageira e de simples resolução “Nada é coisa passageira né. Às vezes dá assim, quando você toma um banho, toma aí um copo de água de açúcar uma coisa aquilo sara, vai embora, desaparece, por causa do cheiro forte do produto dessas coisas né.” (E4), “Não, não...isso é coisa simples né. Num é causa de médico não” (E8). Isso difere do encontrado por Banerjee et al. (2017) que observaram que a procura por atendimento médico era expressiva (86%). De acordo com a ANDEF (2013) a pessoa exposta a produtos tóxicos deve receber cuidados médicos imediatamente após a exposição.

Todos os agricultores relataram que não tinham local próprio para o armazenamento dos defensivos e das embalagens vazias como exige a legislação (ABNT NBR 9843, 2004), porém salientaram que eles são armazenados em locais apropriados para a guarda, uma vez que são distantes das residências, isolados e separados de outros produtos e equipamentos, cujo acesso muitas vezes é restrito a animais e crianças. Estes resultados contrastam com os encontrados por Jin et al. (2017), em que a maioria dos defensivos agrícolas eram armazenados nas residências e a minoria em depósitos específicos.

A devolução das embalagens vazias era realizada em postos de recebimento autorizados, distante das fazendas, visto que o estabelecimento comercial (cooperativa) que os vendiam não contava com local para armazenamento das embalagens após o uso. Os agricultores afirmaram realizar os procedimentos necessários para a devolução, como a tríplice lavagem e a perfuração das embalagens, conforme exigido pela legislação. A lavagem das embalagens vazias visa a segurança das pessoas pela redução de riscos de contaminação, a preservação do meio ambiente e o aproveitamento total do defensivo (aspecto econômico) como orientado pela Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF, 2012).

A maioria dos agricultores (73,3%) relatou ser esta a etapa mais difícil de realizar. Os principais fatores apontados por eles são a falta de transporte adequado por partes dos agricultores, visto que o veículo apropriado segundo a legislação é do tipo caminhonete (ANDEF, 2012), o agendamento prévio do dia e horário, a separação das embalagens de acordo com as notas, a escassez de funcionários no posto de recebimento, que contava apenas com um funcionário para conferir e retirar todas as embalagens e o fato do posto de recebimento muitas vezes se encontrar fechado, o que faz com que as embalagens tenham de ser levadas novamente para as propriedades. Diante disso, a resolução para o destino de muitas embalagens vazias é a incineração. Mesmo sabendo que este comportamento é incorreto os agricultores o fazem devido aos fatores apresentados anteriormente. “A parte mais difícil é a entrega. É a devolução.” (E12). “Porque, que vê o que já aconteceu comigo, o posto mais perto que nós tem aqui é no trevo da cidade vizinha né, já aconteceu de eu arrumar os veneno tudo, por na caminhonete, eu arrumei a caminhonete emprestada, levei lá, cheguei lá nove horas e tava tudo fechado. Aí tive que trazer tudo para trás través, aí eu falei isso, num tem jeito, tem que queimar mesmo” (E15).

Ainda nesse contexto, o baixo nível de escolaridade foi apontado como um fator dificultador do adequado descarte das embalagens vazias. “[...]eu acho difícil porque meu estudo é pouco pra gente fazer aquelas separação ali agente tem que olhar nota por nota esses

trem assim e eu não dou conta de lê, fazer essa separação, então pra mim é meio difícil.” E(8). Essa constatação assemelha com as encontradas por Jin et al., (2017), em que o descarte das embalagens vazias eram inadequados, sendo realizados nos campos, através da incineração ou enterrados. Porém, essa conduta é inadequada, pois as embalagens de defensivos após o uso pode facilmente levar à contaminação do solo agrícola e da água, que posteriormente virá a causar a contaminação humana (INPEV, 2011).

Esses achados contrastam com a situação brasileira, uma vez que o Brasil é considerado referência mundial em logística reversa de embalagens vazias de defensivos, onde o recolhimento chega a 76% (INPEV, 2015). De acordo com a legislação, cabe aos produtores rurais a responsabilidade de devolver as embalagens devidamente lavadas e inutilizadas nos locais indicados pelos agentes de distribuição na nota fiscal da compra e, aos estabelecimentos comerciais e cooperativas cabe, por sua vez, além de fazerem a indicação, dispor de local adequado de recebimento das embalagens. Enquanto, aos fabricantes compete promover sua destinação final adequada, exercida no Brasil pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (BRASIL, 2000).

Os agricultores salientaram o que seria mais viável para a devolução adequada. “Ela (referindo-se a cooperativa) deveria fazer um... lugar de recolher as embalagens porque se a cooperativa vende um produto pra nós porque eu sou cooperado o que acontece eu acho que eles deveriam montar uma indústria de industrializar esses, esses... vasilhame porque se a gente já vem direto da cooperativa pra comprar as coisas, a gente já vinha e trazia as embalagens.” (E9).

A grande preocupação que permeia a destinação inadequada das embalagens é o impacto ambiental que pode ser provocado quando elas são abandonadas no ambiente ou descartadas em aterros, lixões ou incineradas ficando assim o meio ambiente e as pessoas expostos às intempéries podendo haver contaminação do solo, águas superficiais e lençóis freáticos. Sem deixar de destacar a possibilidade de reutilização das embalagens, o que coloca em risco a saúde de animais e do homem (INPEV, 2011).

No entanto, os agricultores têm a preocupação e o cuidado em armazenar essas embalagens em locais seguros, onde não há contato com crianças e animais. “Sempre tem, mas não deixo assim os trem muito samiado não” (E15). Eles também afirmam não reutilizar as embalagens para atividades domésticas.

As contaminações podem ser evitadas com simples hábitos de higiene e cuidados com as vestimentas. Por isso, após o manuseio dos defensivos é importante realizar a higiene pessoal lavando as mãos e o rosto, seguido de banho com bastante água e sabonete vestindo roupas limpas posteriormente (ANDEF, 2013). Constatou-se que dentre essas medidas de higiene pessoal o banho (53,3%) foi uma das principais medidas relatadas, 46,7% dos produtores relataram continuar suas atividades e só tomavam banho a noite, quando retornavam ao domicílio, 26,7% deles por morarem na zona urbana e trabalharem na rural relataram que, na maioria das vezes, só tomam o banho na residência, mas retiravam os EPI e lavavam as mãos logo após as pulverizações. Houveram relatos de que o correto é tomar o banho no local de trabalho, mas que, em geral, não o faz. Uma maior preocupação se dá, neste sentido, apenas quando a roupa está molhada. Foi informado por um produtor que após a aplicação do defensivo, ele retorna à lavoura para conferir se a aplicação foi bem executada “Em seguida eu vou na lavoura dá uma conferida né, vê se ficou bem pulverizado, vê se ficou...se não ficou algum lugar sem passar né” (E13), vale destacar que este mesmo produtor não faz uso de EPI. De acordo, com a legislação tem-se o intervalo de reentrada (intervalo de tempo entre a aplicação e a entrada de pessoas na área tratada sem a necessidade do uso de EPI) a lavoura após a aplicação dos defensivos para torná-la segura (BRASIL, 2002).

A produção sem o uso de defensivos não foi relatada, e quando questionados se teria como produzir sem o uso deles, 60% disse que poderia até produzir, porém a produtividade seria baixa, pois “as pragas e as doenças não deixam” (E2). Alguns foram categóricos e afirmaram não ser possível. “Isso é bobagem, bobeira. Eu falo, ainda brinco [...] Ambientalista tem um negócio de tirar os defensivos, se tirar o povo vai tudo morrer de fome. Gente...se sabe que não tem jeito, e assim é gado é tudo. [...] Não, não consegue sem eles (os defensivos) não. Porque não dá conta de tratar do povo não, se não usar. [...] Se tirar ocê colhe pra despesa, né.” (E1). Em concordância com esses resultados, Abdollahzadeh et al. (2015) ressaltaram que o aumento da produtividade das culturas é o efeito benéfico mais percebido em relação ao uso dos defensivos. Também no estudo de Fan et al. (2015) a maioria dos entrevistados acreditava que o uso de menos defensivos reduziria os rendimentos. Enquanto, no estudo de Jallow et al. (2017), os agricultores acreditavam que os defensivos eram indispensáveis para altos rendimentos.

As estratégias adotadas informadas por 100% dos agricultores para o controle de pragas em suas propriedades foram exclusivamente uso dos defensivos agrícolas, que são usados tanto

para a prevenção do aparecimento de pragas, quanto para a eliminação das mesmas quando estas já se encontravam instaladas nas lavouras. Resultados semelhantes foram encontrados por Jallow et al. (2017) em que 95% dos entrevistados indicou o uso de defensivos químicos como estratégia de controle de praga adotada em suas fazendas, seguida de rotação de culturas planejadas, destruição de resíduos de colheita, uso de variedades resistentes a doenças e insetos, controle de feromônio e biopesticidas, sendo que o controle pelos inimigos naturais não foram adotados por nenhum agricultor.

Foi possível observar por meio desse estudo que as Boas Práticas Agrícolas (BPA) são aplicadas parcialmente pelos agricultores entrevistados. A maioria (66,7%) relatou que seguiam as recomendações do responsável técnico (engenheiro agrônomo) para o preparo do solo, controle de pragas, controle de plantas invasoras, manipulação e aplicação de defensivos e observavam as especificações constantes no rótulo. Ainda, priorizavam o controle de pragas com a adoção do Manejo Integrado de Pragas, com o uso de defensivos registrados para a cultura. A adoção das boas práticas na manipulação e aplicação dos defensivos e observação ao período de carência na colheita foi relatado por muitos agricultores (76%). Essas atitudes vêm a atender alguns critérios, como a obediência a recomendação do responsável técnico quanto ao preparo do solo e uso de fertilizantes e defensivos, manipulação e aplicação de acordo com recomendações técnicas do receituário agrônomo e observação constante nas especificações do rótulo, preconizados pelas boas práticas agrícolas instituídas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) (MAPA, 2017).

Em relação aos parâmetros bioquímicos avaliados, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos exposto e controle, conforme mostra a Tabela 5. Pode-se observar também uma alta heterogeneidade entre os dados, principalmente nas enzimas hepáticas, nas quais o coeficiente de variação variou de 28,66 a 52,25% (Tabela 5). Entretanto, há diversos estudos na literatura demonstrando alterações em parâmetros bioquímicos em trabalhadores que estão diretamente em contato com pesticidas (AZMI, et al., 2006; ARAÚJO et al., 2007; GARCIA et al., 2016).

**Tabela 5.** Concentração dos níveis enzimáticos da população estudada e do grupo controle

	ACHE		FA		TGO		TGP	
	Média	Desvio	Média	Desvio	Média	Desvio	Média	Desvio
Grupo 1	7.560	1.412	62,07	16,10	24,07	6,69	22,52	10,45
Grupo 2	6.696	1.237	57,40	18,53	21,40	7,02	23,20	16,47

Grupo 1: Grupo exposto; Grupo 2: Controle (não agricultores). ACHE –Acetilcolinesterase; FA – Fosfatase Alcalina; TGO – TGO – Glutamato Oxaloacetato Transaminase; TGP – Glutamato piruvato transaminase.

Para a AChE, os níveis de atividade considerados normais variam de 4620 a 11500 U/L para homens adultos e de 3930 a 10800 U/L para mulheres adultas. No presente estudo, os valores de atividade de AChE variaram de 4873 a 10031 U/L, estando todos dentro da faixa de normalidade.

Os resultados da AChE encontrados com níveis próximos ao mínimo dos valores de referência, pertenciam aos produtores que relataram não usarem os EPI. Percebeu-se que havia certa preocupação com a proteção durante as aplicações, porém essa preocupação não sobressaiu sobre as práticas do uso adequado do EPI, havendo, portanto, uma divergência do que era recomendado e praticado pelos agricultores, pois 26,6% não usavam nenhum tipo de EPI. Enquanto, que a maioria (53,3%) utilizava apenas algumas peças do EPI.

Esta atitude ficou evidenciada devido falas como esta: “Mais um pouco é descuido da gente, a gente podia isolar um pouco né.”, “Ah, às veiz, tem hora que ocê tira a luva, ah... esqueci de por aquele produto, sabe como é que é, ocê vai lá e põe sem luva. A num vou pegar só vou espejar. Sabe o que é acontece... mas num pode. Seria um discuido, mas eu sei que tá errado.”. Estas atitudes são consistentes com as relatadas por Chisté e Có (2003) em seu estudo em Valão de São Lourenço (ES) com pequenos agricultores e suas percepções sobre o uso dos defensivos. Os agricultores utilizavam grandes quantidades de defensivos altamente tóxicos sem a devida orientação técnica, sem o uso adequado de EPIs e demonstraram que tem conhecimento de que os defensivos causam problemas à saúde.

O teste da acetilcolinesterase deve ser realizado principalmente por agricultores por estarem em contato direto com os defensivos agrícolas. Nos casos em que há intoxicação por organofosforados, há baixa dessa enzima no organismo. É preconizado pela NR 7- Programa de controle médico de saúde ocupacional periodicidade mínima semestral para a realização da análise da colinesterase (BRASIL, 1978). Os agricultores deste estudo, não faziam qualquer tipo de controle da exposição aos defensivos, a maioria (85,2%) sequer havia feito o exame de

acetilcolinesterase em algum momento das suas vidas. Foi observado no presente estudo que os agricultores usavam defensivos do grupo químico dos organofosforados e carbamatos, e estes componentes químicos quando ingeridos, inalados ou absorvidos, são responsáveis diretos pelas variações dos níveis de acetilcolinesterase.

O exame médico dos trabalhadores expostos a substâncias tóxicas é indispensável para comprovar a presença de efeitos adversos, consequência de medidas de controle insuficientes, práticas de trabalho inapropriadas ou exposição a níveis máximos toleráveis das pessoas expostas.

Os valores de referência para atividade de FA variam de 30 a 120 U/L, para indivíduos adultos. Os resultados encontrados para essa enzima variaram de 33 a 93 U/L. Já para TGO, os valores encontrados foram de 15 a 47 U/mL sendo que os valores de atividade considerados normais variam de 4 a 36 U/mL. E para a atividade de TGP, a faixa considerada normal é de 4 a 32 U/mL, sendo observadas atividade de TGP, neste estudo, variando de 10 a 52 U/mL.

Os níveis aumentados dessas enzimas na corrente sanguínea estão relacionados com a existência de alguma lesão nas células hepáticas, porém as pequenas elevações nos níveis das enzimas hepáticas (menos de duas vezes acima do valor de referência) podem ocorrer em indivíduos normais (PRATT e KAPLAN, 2000). Dentre outros fatores os medicamentos também podem ocasionar a elevação das enzimas hepáticas. Muitos agricultores faziam uso contínuo de medicamentos. Deve ser enfatizado que ter níveis mais altos que o normal destas enzimas não indicam necessariamente, uma doença hepática estabelecida, podendo indicar um problema ou não, dependendo do quadro clínico em geral (HU et al., 2012). No nosso estudo não foi realizado a anamnese dos agricultores, somente foram coletadas informações sobre o quadro geral de saúde (medicamentos, doenças crônicas).

Os agricultores relataram que são utilizados uma mistura de defensivos em cada aplicação, portanto, não obstante da toxicidade de cada produto isoladamente, eles usam de forma conjunta o que também foi observado por Garcia et al. (2016) e Araújo et al. (2007).

#### **4 CONCLUSÃO**

Os defensivos agrícolas químicos foram utilizados pelos agricultores para o controle das pragas em suas lavouras, devido à percepção de que são indispensáveis para a obtenção de maior produtividade e, nesse sentido, é considerada a melhor alternativa. Um maior

conhecimento dos agricultores quanto às alternativas para o combate e a prevenção de pragas pode contribuir para a diminuição o uso dos defensivos.

Os níveis enzimáticos dos agricultores que trabalhavam ativamente nos processos de produção agrícola (grupo exposto) não apresentaram diferença significativa quando comparado com o grupo controle. Percebeu-se que o uso adequado do EPI era deficiente entre a maioria dos agricultores o que pode causar maior exposição aos defensivos. A normalidade dos níveis enzimáticos dos agricultores que confirmaram exposição aos defensivos sem o EPI e com deficiência desses, podem ter ocorrido devido às aplicações serem em áreas pequenas demandando curto espaço de tempo e, portanto, menor contato (exposição).

Embora saibam que os defensivos possam ter efeito prejudicial à saúde, os agricultores são expostos aos defensivos com proteção insuficiente e, ou inadequada. Nesse sentido, devem-se realizar mais treinamentos acessíveis a esses produtores e aumentar as orientações prestadas pelo serviço de extensão, quanto ao correto uso e manipulação dos defensivos, para aumentar a segurança durante as etapas de pulverização. A alternativa mais eficiente seria um serviço mais ativo dos agrônomos da cooperativa que prestam assistência, visto que esse foi o acesso a orientações mais relatadas pelos agricultores.

Diante do exposto, são necessárias intervenções educativas de formação sobre a manipulação de defensivos e precauções de segurança, a fim de contornar os problemas existentes, com a implementação de aplicação das boas práticas agrícolas para diminuir a exposição dos agricultores e da população em geral aos defensivos.

## 5 REFERÊNCIAS

ABDOLLAHZADEH, G.; SHARIFZADEH, M. S.; DAMALAS, C. A. Perceptions of the beneficial and harmful effects of pesticides among Iranian rice farmers influence the adoption of biological control. **Crop protection**, v. 75, p. 124 – 131, 2015.

ABNT NBR 9843 – Norma Brasileira. Agrotóxicos e afins – Armazenamento, movimentação e gerenciamento em armazéns, depósitos e laboratórios. 2004.

AGEITEC. Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Agrotóxicos no Brasil. Disponível em: <

[http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura\\_e\\_meio\\_ambiente/arvore/CONTAG01\\_40\\_210200792814.html](http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_40_210200792814.html)>. Acesso em 16 Fev. 2017.

ANDEF – Associação Nacional de Defesa Vegetal. Manual de Armazenamento de Produtos Fitossanitários. Campinas: Linea Criativa, 2012, 66p.

ANDEF – Associação Nacional de Defesa Vegetal. Manual de Boas Práticas no Uso de EPIs. Campinas: Linea Criativa, 2013, 34p.

ANDEF – Associação Nacional de Defesa Vegetal. Manual de Boas Práticas Agrícolas no Campo. Campinas: Linea Criativa, 2012, 18p.

ANDEF – Associação Nacional de Defesa Vegetal. Manual de Tecnologia de Aplicação. Campinas: Linea Criativa, 2013, 78p.

ANDRADE, A. S.; QUEIROZ, V. T.; LIMA, D. T.; DRUMOND, L. C. D.; QUEIROZ, M. E. L. R.; NEVES, A. A. Análise de risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas por pesticidas em municípios do Alto Paranaíba-MG. **Química Nova**, v.34, p. 1129- 1135, 2011.

ARAÚJO, A. J., LIMA, J. S., MOREIRA, J. C., JACOB, S. C., SOARES, M. O., MONTEIRO, M. C. et al. Exposição múltipla a agrotóxicos e efeitos á saúde: estudo transversal em amostra de 102 trabalhadores rurais, Nova Friburgo, RJ. **Ciência Saúde Coletiva**, v.12, p. 115-130, 2007.

ASOGWA, E. U.; DONGO, L. N. Problems associated with pesticide usage ad application in Nigerian cocoa production: A review. **African Journal of Agricultural Research**, vol. 4, p. 675-683, 2009.

AZMI, A.M.; NAQVI, S. N. H.; AZMI, M. A.; ASLAM, M. Effect of pesticide residues on health and different enzyme levels in the blood of farm workers from Gadap (rural area) Karachi-Pakistan. **Chemosphere**, v. 64, p. 1739-1744, 2006.

BANERJEE, I.; TRIPATHI, S. K.; ROY, A. S.; SENGUPTA, P. Pesticide use pattern among farmers in rural district of West Bengal, India. **Journal of Natural Science, Biology and Medicine**, v. 5, p. 313 – 316, 2017.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2006.

BARREIRA, L. P.; PHILIPPI JUNIOR, A. A problemática dos resíduos de embalagens de agrotóxicos no Brasil. In: XXVIII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária y Ambiental; 2002; Cancun, México.

BOCHNER, R. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – SINITOX e as intoxicações humanas por agrotóxicos no Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**. Rio de Janeiro, v. 12, p. 73-89, 2007.

BRASIL. Decreto nº 4074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Brasília, 4 de janeiro de 2002.

BRASIL. Lei nº 9974, de 6 de junho de 2000. Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 2000. Brasília, 6 de junho de 2000.

BRASIL. Lei nº 6514 de 22 de dezembro de 1977. Estabelece a regulamentação de segurança e medicina no trabalho.

BRASIL. Lei nº7802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

BRASIL. Ministério da Saúde. FIOCRUZ. SINITOX. Disponível em: <[http://www.fiocruz.br/sinitox\\_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home](http://www.fiocruz.br/sinitox_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home)>. Acesso em 02 mar. 2016.

BRASIL. NR7- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. Brasília, 08 de junho de 1978.

BRASIL. Portaria nº 121, de 30 de setembro de 2009. Estabelece as normas técnicas de ensaios e requisitos obrigatórios aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI enquadrados no Anexo I da NR-6.

BRISBOIS, B. Bananas, pesticides and health in southwestern Ecuador: A scalar narrative approach to targeting public health responses. **Social Science & Medicine**, v. 150, p. 184-191, 2016.

CALDAS, L. Q. A. Intoxicações exógenas agudas por carbamatos, organofosforados, compostos bupiridílicos e piretróides. Niterói, RJ: Centro de Controle de Intoxicações, 2000.

CANTARUTTI, T. F. **Risco tóxico de resíduos de pesticidas em alimentos e toxicidade reprodutiva em ratos wistar**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2005.

CHISTÉ, A. M.D.; CO, W. L. Percepção ambiental de uma comunidade pomerana em relação ao uso de agrotóxicos. **Natureza on line**, v.1, p. 7-11, 2003.

DAMALAS, C. A.; THEODOROU, M. G.; GEORGIU, E.B. Attitudes towards pesticide labelling among Greek tobacco farmers. **International Journal of Pest Management**, v. 52, p. 269-274, 2006.

DAMALAS, C.; ELEFTHEROHORINOS, I. G. Pesticide exposure, safety issues and risk assessment indicators. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 8, p. 1402 – 1419, 2011.

DUFOUR, D. R. **Avaliação da função e da lesão hepática**. In: Henry, J. B. Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20. ed. Barueri, SP: Manole, p. 307- 324, 2008.

DUFOUR, D. R.; LOTT, J. A.; HENRY, J. B. **Enzimologia Clínica**. In: Henry, J. B. Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20. ed. Barueri, SP: Manole, p. 331 – 351, 2008.

FAN, L.; NIU, H.; YANG, X.; QIN, W.; BENTO, C. P. M. Factors affecting farmers behaviour in pesticide use: Insights from a field study in northern China. **Science of the Total Environment**, v.537, p. 360-368, 2015.

FAO. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O que é agricultura familiar? Disponível em: <<http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/pt/>>. Acesso em: 15 Jan. 2017.

FARIA, N. M. X; FASSA, A. G., FACCHINI, L. A. Pesticides poisoning in Brazil: the official notification system and challenges to conducting epidemiological studies. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, p. 25-38, 2007.

FENSKE, R. A.; DAY Jr., E. W.; FRANKLIN, C. A.; WORGAN, J. P. Assessment of exposure for pesticide handlers in agricultural, residential and institutional environments. In Occupational and Residential Exposure Assessment for Pesticides. Eds.; John Wiley & Sons: Chichester, UK; p. 13-43, 2005.

GARCIA, C. R. G.; PARRÓN, T.; REQUENA, M.; ALARCÓN, R. TSATSAKIS, A. M.; HERNÁNDEZ, A. F. Occupational pesticide exposure and adverse effects at the clinical, hematological and biochemical level. **Life Sciences**, v. 145, p. 274 – 283, 2016.

HERNÁNDEZ, A. F.; PARRÓN, T.; TSATSAKIS, A. M.; REQUENA, M.; ALARCÓN, R.; LÓPEZ-GUARNIDO, O. Toxic effects of pesticide mixtures at a molecular level: their relevance to human health. **Toxicology**, v. 307, p. 136-145, 2013.

HU, Y., SNITKER, S., RYAN, K. A., YANG, R., MITCHELL, B. D., SHULDINER, A. R., ZHU, D.; GONG, D. W. Serum alanine aminotransferase is correlated with hematocrit in healthy human subjects. **Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation**, v.72, p. 258-264, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2014. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/impressa/ppts/00000024052411102015241013178959.pdf>>. Acesso em 21 Fev. 2017.

INCA. Instituto Nacional de Câncer. Brasil lidera o ranking de consumo de agrotóxicos. Disponível em: <[http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/comunicacaoinformacao/site/home/namidia/brasil\\_lidera\\_ranking\\_consumo\\_agrotoxicos](http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/comunicacaoinformacao/site/home/namidia/brasil_lidera_ranking_consumo_agrotoxicos)>. Acesso em: 08 Fev. 2017

INPEV. Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Disponível em: <<http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/sobre-o-sistema>>. Acesso em: 10 Fev. 2017.

INPEV. Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Disponível em: <<https://brasilagro.wordpress.com/2015/10/24/embalagens-de-agrotoxicos-brasil-e-referencia-mundial-em-logistica-reversa/>>. Acesso em: 10 Fev. 2017.

JALLOW, M. F. A.; AWADH, D. G.; ALBAHO, M. S.; DEVI, V. Y.; THOMAS, B. M. Pesticide risk behaviors and factors influencing pesticide use among farmers in Kuwait. **Science of the Total Environment**, v. 574, p. 490-498, 2017.

JIN, J.; WANG, W.; HE, R.; GONG, H. Pesticide use and risk perceptions among small-scale farmers in Anqiu County, China. **Journal of Environmental research and Public Health**, v. 14, p.1-10, 2017.

KHAN, M.; MAHMOOD, H. Z.; DAMALAS, C. A. Pesticide use and risk perceptions among farmers in the cotton belt of Punjab, Pakistan. **Crop Protection**, v. 67, p. 184-190, 2015.

LEMUS, R.; ABDEKGHANI, A. Chlorpyrifos: an unwelcome pesticide in our homes. **Revista Environmental Health**, v.15, p. 421-433, 2000.

LIMA, F.J.; MARQUES, P. R.; NUNES, G. S.; TANAKA, S. M. Inseticida organofosforado metamidofós: aspectos toxicológicos e analíticos. Pesticidas: **Revista Ecotoxicologia e Meio Ambiente**, v. 11, p. 17-34, 2001.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boas Práticas Agrícolas. Disponível em: < <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/producao-integrada/boas-praticas-agricolas>>. Acesso em: 10 Fev. 2017.

MOSTAFALOU, S.; ABDOLLAHI, M. Pesticides and human chronic diseases: evidences, mechanisms, and perspectives. **Toxicology and Applied Pharmacology**, v. 268, p. 157-177, 2013.

MURUSSI, C.; HORN, R. C.; SANTI, A.; CLASEN, B. E.; REIS, G.; SOUZA, D.; BORTOLOTTI, J. W.; MANFIO, C. E.; LORO, V. L. Changes in oxidative markers, endogenous antioxidants and activity of the enzyme acetylcholinesterase in farmers exposed to agricultural pesticides – a pilot study. **Ciência Rural**, v.44, p.1186-1193, 2014.

NERILO, S. B.; MARTINS, F. A.; NERILO, L. B.; SALVADEGO, V. E. C. ENDO, R. Y.; ROCHA, G. H. O.; MOSSINI, S. A. G.; JANEIRO, V.; NISHIYAMA, P.; MACHINSKI Jr., M. Pesticide use and cholinesterase inhibition in small-scale agricultural workers in southern Brazil. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 50, p. 783-791, 2014.

NUNEZ, S. C.; NEGRON, L. B.; SERRANO, M. C. M.; GONZALEZ, R. M. P. Estudio bioquímico-clínico em personas ocupacionalmente expuestas a la accion de agroquímicos y efectos de su uso frecuente sobre la salud. **Ciência e Investigacion**, v.1, p.1-15, 1998.

OLIVEIRA, J. J. S; ALVES, S. R; MEYER, A; PEREZ, F.; SARCINELLI, P. N; MATTOS, R. C, et al. Influência de fatores socioeconômicos na contaminação por agrotóxicos, Brasil. **Revista Saúde pública**, v. 35, p. 130-135, 2001.

PRATT, D. S.; KAPLAN, M. M. Evaluation of abnormal liver-enzyme results in asymptomatic patients. **New England Journal of Medicine**, v. 342, p. 1266-1271, 2000.

REITMAN, S.; FRANKEL, S. A colorimetric method for the determination of serum glutamic oxalacetic and glutamic pyruvic transaminases. **American Journal of Clinical Pathology**, v. 28, p. 56-63, 1957.

REMOR, A. P.; TOTTI, C. C.; MOREIRA, D. A.; DUTRA, G. P.; HEUSER, V. D.; BOEIRA, J. M. Occupational exposure of farm workers to pesticides: Biochemical parameters and evaluation of genotoxicity. **Environment International**, v. 35, p. 273-278, 2009.

ROY, A. V. Rapid method for determinig alkaline phosphatase activity in sérum with thymolphthalein monophosphate. **Clinical Chemistry**, v. 16, p. 431-436, 1970.

SINITOX. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. Dados de Intoxicação. Disponível em: < <http://sinitox.iciet.fiocruz.br/dados-nacionais>>. Acesso em: 18 Fev. 2017.

SURGAN, M.; CONDON, M.; COX, C. Pesticide risk indicators: Unidentified inert ingredients compromise their integrity and utility. **Environmental Management**, v. 45, p. 834 – 841, 2010.

ZADJALI, S. A.; MORSE, S.; CHENOWETH, J.; DEADMAN, M. Personal safety issues related to the os pesticides in agricultural production in the Al-Batinah region of Northern Oman. **Science of the Total Environment**, v. 502, p. 457-461, 2015.

ZHANG, Y.; GUO, Y.; XIAN, Y.; CHEN, W.; ZHAO, Y.; JIANG, X. Nanomaterials for Ultrasensitive Protein Detection. **Advanced Materials**, v. 25, p. 3802 – 3819, 2013.

## **APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido**

### **TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**

O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “QUANTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES E CARACTERIZAÇÃO DO USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM TRABALHADORES RURAIS DO ALTO PARANAÍBA”. Nesta pesquisa pretendemos caracterizar o uso de defensivos agrícolas e quantificar seus resíduos em trabalhadores rurais do Alto Paranaíba, MG. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é devido ao uso de defensivos agrícolas nas atividades da lavoura para combater pragas e vetores de doenças, podendo estes serem tóxicos.

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: 1. Realização de uma entrevista de aproximadamente 40 minutos, cujo som será gravado, com auxílio de um gravador de voz. Após serem transcritos os áudios serão apagados. 2. Coleta de 10 mL de sangue. O sangue coletado será utilizado para análise de compostos que indicam o uso dos defensivos e os volumes das amostras, se restantes, serão armazenados a temperatura de congelamento no Laboratório de Análise de Solo e Alimentos. Os participantes terão sua identidade preservada, sendo garantido o sigilo da sua identidade em todas as etapas da pesquisa. As amostras serão codificadas e armazenadas no Laboratório de Análises Clínicas, até o momento das análises.

Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em possível constrangimento durante a entrevista, o que será minimizado pela relação cordial com o entrevistado e pela não obrigatoriedade em responder qualquer pergunta que o participante não queria responder. Na condição de indicação de nomes de outros trabalhadores rurais o identidade do trabalhador rural indicante não será mencionado. Além disso, a coleta de sangue pode levar ao aparecimento de hematomas no local da punção venosa, porém a coleta será realizada por profissional capacitado, com materiais descartáveis, em ambiente tranquilo e empregando adequados métodos higiene durante a coleta.

A pesquisa contribuirá para orientação dos trabalhadores rurais quanto aos efeitos e perigos proporcionados pelos defensivos agrícolas. Os voluntários serão orientados sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção e da higienização após a aplicação dos defensivos agrícolas. Aqueles que apresentarem alterações bioquímicas serão encaminhados para atendimento médico no serviço de saúde da cidade.

Para participar deste estudo o Sr.(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes

desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito à indenização. O Sr.(a) tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr.(a) é atendido(a) pelo pesquisador. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O(A) Sr.(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar. Seu nome ou o material que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão.

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade Federal de Viçosa campus de Rio Paranaíba e a outra será fornecida ao Sr.(a).

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, e depois desse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo à legislação brasileira, em especial, à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as informações somente para fins acadêmicos e científicos.

Eu, \_\_\_\_\_, contato \_\_\_\_\_, fui informado(a) dos objetivos da pesquisa “QUANTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES E CARACTERIZAÇÃO DO USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM TRABALHADORES RURAIS DO ALTO PARANAÍBA” de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas

Rio Paranaíba, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

---

Assinatura do Participante

---

Lucélia Cristina Alves

Pesquisador responsável: Lucélia Cristina Alves

Endereço: Rua Aristides de Souza Rocha, 149, São Cristóvão, Rio Paranaíba

Telefone: (34) 9 9972 5546 - E-mail: [lucelia\\_lu18@hotmail.com](mailto:lucelia_lu18@hotmail.com)/ lucelia.alves@ufv.br

Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa, você poderá consultar:

CEP/UFV – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

Universidade Federal de Viçosa

Edifício Arthur Bernardes, piso inferior

Av. PH Rolfs, s/n – Campus Universitário

Cep: 36570-900 Viçosa/MG

Telefone: (31)3899-2492

Email: [cep@ufv.br](mailto:cep@ufv.br)

[www.cep.ufv.br](http://www.cep.ufv.br)

**APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista**  
**ROTEIRO DE ENTREVISTA**

- 1- Qual é a data de nascimento do senhor(a)?
- 2- Quantos anos frequentou a escola? Se parou de estudar, parou em qual série?
- 3- Qual é a renda média do Senhor(a) por mês ou por ano? Quantas pessoas moram na mesma casa com o senhor(a)?
- 4- O senhor faz uso de medicamento? Se sim, qual(is)?
- 5- O senhor fuma?
- 6- Com quantos anos o Senhor (a) iniciou suas atividades na agricultura (no campo)?
- 7- O que é plantado no terreno? É o Senhor (a) mesmo que planta? Tem funcionários que o auxilia?
- 8- Quanto o senhor(a) produzem média?
- 9- O Senhor(a) usa alguma estratégia para aumentar a produção?
- 10- Quais são as etapas do plantio? O Senhor(a) usa algum produto antes de plantar? E depois que já plantou ?
- 11- Com qual frequência o senhor usa esses produtos?
- 12- Como o Senhor(a) lida com pragas?
- 13- Qual é a praga mais comum aqui na plantação do Senhor?
- 14- Quando há necessidade de aplicação dos produtos, é aplicada uma fórmula ou uma mistura de fórmulas?
- 15- Quem faz a aplicação dos defensivos agrícolas? É o senhor? Alguém o ajuda?
- 16- Como é feita essa aplicação (bomba, manual ou por trator)?
- 17- Como o corpo do senhor (a) fica quando aplica os produtos? O senhor(a) sente alguma coisa? Por exemplo: coceiras, vermelhidão no rosto ou irritação no nariz , garganta e olhos, dor de cabeça, tontura, insônia, náuseas, vômitos, falta de ar, fraqueza, esquecimento, tremores, visão embaçada ou dificuldade para enxergar?
- 18- O senhor procura algum médico quando possui esses sintomas? (Fazer esta pergunta se o entrevistado relatar algum sintoma durante a pergunta anterior)
- 19- Quanto tempo, em média, dura cada aplicação?
- 20- Me explique como o senhor(a) prepara os produtos para a aplicação.
- 21- O Senhor (a) já recebeu ou recebe alguma orientação/treinamento sobre como usar os defensivos agrícolas?
- 22- Quem indicou o defensivo agrícola a ser usado?

- 23- O Senhor (a) lê o rótulo das formulações para saber como fazer a aplicação?
- 24- O senhor procura seguir as recomendações contidas nos rótulos?
- 25- Me explique (me conte) o que o senhor faz quando acaba de manipular ou aplicar os defensivos agrícolas.
- 26- O Senhor (a) faz alguma coisa para retirar o produto do corpo? O senhor procura tomar banho, lavar as mãos? Me conte como faz isso?
- 27- No momento do preparo da calda já caiu ou cai sobre a pele? O que o senhor(a) faz em seguida, quando isso acontece?
- 28- O Senhor(a) usa alguma roupa especial durante a aplicação? Qual(is)?
- 29- Após a aplicação dos defensivos agrícolas o Senhor (a) já se sentiu mal?
- 30- O Senhor (a) tem alguma preocupação ao aplicar o pesticida?
- 31- O que o Senhor(a) acha que eles podem fazer com a saúde?
- 32- Nos últimos tempos o Senhor teve algum problema de saúde?
- 33- O Senhor acha que esse problema teve a ver com o trabalho do senhor?
- 34- O Senhor acha que esse problema teve a ver com o uso dos defensivos agrícolas?
- 35- Gostaria de agradecê-lo pela concessão da entrevista e o Sr. Poderia me indicar algum trabalhador rural que possa também contribuir para o nosso projeto. Ressaltando que o nome do Sr. não será mencionado para o próximo participante.

\*O termo DEFENSIVO AGRÍCOLA será substituída pelo nome que o trabalhador mencionar no início da entrevista.